



BLADZIEKTEN

Toepassing HERFOMYC is toepasbaar bij kruidachtige gewassen in de land- en tuinbouw; waar er, door een minder vitale bodem en een zwakke weerbaarheid van planten, sprake kan zijn van bladziekten. Het product ondersteunt het natuurlijk herstellend vermogen, werkt verzorgend, voedend en plantversterkend bij invloeden van buitenaf, in de bodem en bij de wortels.

Samenstelling HERFOMYC bestaat uit een hoog geconcentreerde samenstelling van specifiek werkende kruidenconcentraten op basis van water. HERFOMYC is van natuurlijke en plantaardige afkomst. Het product is niet giftig, niet persistent en laat geen reststoffen achter in het milieu. Verkrijgbaar in vloeibare vorm.

Werking HERFOMYC wordt opgenomen door het blad van het gewas en door de bodem. Dankzij de aanwezige wortelstimulerende en plantverzorgende bestanddelen zullen planten een verhoogde weerbaarheid en vitaliteit ontwikkelen.

Toediening HERFOMYC kan het beste preventief worden toegediend.

Voor een optimale werking zijn droge weersomstandigheden nodig, zodat bladopname kan plaatsvinden. Belangrijk is bewolkt en bedekt weer.

HERFOMYC kan toegediend worden door middel van spuiten of sproeien. HERFOMYC heeft een werkingsduur van twee tot drie weken, waarna een vervolgbehandeling noodzakelijk kan zijn.

Toediening en dosering | vloeibare vorm

HERFOMYC (L) kan, opgelost in water, toegediend worden door middel van spuiten of sproeien. Spuiten met fijne druppels zodat het middel kan worden opgenomen door het blad.

Oppervlakte	Lage dosering		Hoge dosering	
	HERFOMYC	Water	HERFOMYC	Water
m ²				
1.000	1 liter	50-100 liter	2 liter	50-100 liter
5.000	5 liter	250-500 liter	10 liter	250-500 liter
10.000	10 liter	500-1.000 liter	20 liter	500-1.000 liter